

儿童可能患有眼疾的一些症状

如果出现一个或多个这些症状，请立即带您的孩子去看眼科医生。

### **您孩子的眼睛看起来如何？**

- > 双眼视线不呈一条直线，一只眼球内斜或外斜
- > 眼睑发红、结痂或肿胀
- > 双眼有泪水或发红（发炎情况）

### **您孩子有些什么行为动作？**

- > 经常搓眼
- > 闭起或遮住一只眼睛
- > 歪头或将头向前探出
- > 不能顺利地阅读或做一些需要仔细观察的事情，或在看东西时将物体凑近双眼
- > 在做需要仔细观察的事情时较平时更频繁地眨眼，或看起来不太正常
- > 看东西很模糊或很难看清
- > 眯着眼看东西或皱眉

### **您的孩子说些什么？**

- > “我的眼睛发痒”，“我的眼睛火辣辣的”或“那个我看不太清楚。”
- > 做完需要仔细观察的事情时，您的孩子会说  
“我头晕”，“我头痛”或“我感觉恶心/想吐。”
- > “所有的东西看起来都很模糊”，或“我看到东西有重影。”

记住，即使您的孩子没有说他/她有何不适，也没有异常症状，也不能说明您的孩子眼睛就没有问题了。

### **懒惰眼（弱视）**

懒惰眼，即弱视，是一种不能通过佩戴眼镜进行视力矫正的视力丧失情况。斗鸡眼、双眼视线不呈同一水平线，或一只眼注视能力好于另一只眼的情况均会引起弱视。

## 散光

散光是由于角膜（眼睛的透明窗）前表面形状不规则而引起的。患有散光的儿童通常看垂直线比看水平线更清晰。

## 色盲

患有色盲的儿童并非真的看不到彩色，而是不能辨别某些颜色。

## 远视

在这种情况下，对于正常聚焦能力的眼睛来说，眼球过短，因此，看近物时会变得模糊。

## 近视

在近视情况下，对于正常聚焦能力的眼睛来说，眼球过长，结果导致远处物体成像变得模糊。

## 斜视

斜视指的是双眼不正或不能排成一直线。如不及时治疗，可导致弱视。

## 美国防盲协会

211 West Wacker Drive, Suite 1700

Chicago, Illinois 60606

800.331.2020

Preventblindness.org

CB10 3/08 2009 Prevent Blindness America®

保留所有权利。